



VOCÊ DEVE CONSIDERAR O DESVIO PORTO-SISTÊMICO INTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR (TIPS) PRECOCE PARA SEUS PACIENTES COM SANGRAMENTO VARICOSO?

Ensaio ou estudo	Sobrevida em um ano	Prevenção de novo sangramento	Incidência de encefalopatia hepática (EH) em comparação com farmacoterapia combinada com terapia endoscópica
Estudo clínico controlado e randomizado (RCT) ¹	86%*	97% [‡]	Sem diferença significativa
Estudo de vigilância pós-RCT ²	86%*	93% [§]	Sem diferença significativa
Estudo observacional ³	78%*, [†]	92%	Sem diferença significativa

Todos os resultados acima foram relatados em um ano.

É interessante destacar que o número de pacientes que precisaria ser tratado para salvar uma vida é quatro.³

- Hernandez-Gea, *et al.*

É hora de repensar o TIPS.

Saiba mais em goremedical.com/rethinkTIPS

Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o associado de vendas técnicas da GORE.

* Para um grupo combinado de pacientes com pontuação Child-Pugh C (CP-C) ≤ 13 ou Child-Pugh B com sangramento ativo (CP-B + AB) na endoscopia diagnóstica.

† Em pacientes com pontuação Child-Pugh C ≤ 13 .

‡ Probabilidade atuarial de permanecer livre de falha no controle do sangramento ou de novo sangramento varicoso em um ano.

§ O desfecho primário do estudo é o resultado composto de falha no controle de sangramento agudo ou em evitar novo sangramento varicoso clinicamente significativo. Os dados são apresentados como a porcentagem que não apresentou o resultado composto.

|| Desfecho composto de falha no controle de sangramento agudo, novo sangramento precoce ou novo sangramento tardio. Os dados apresentados são para pacientes CP-B + AB e pacientes CP-C combinados.

1. García-Pagán JC, Caca K, Bureau K, et al; Early TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) Cooperative Study Group. Early use of TIPS in patients with cirrhosis and variceal bleeding. *New England Journal of Medicine* 2010;362(25):2370-2379.

2. Garcia-Pagán JC, Di Pascoli M, Caca K, et al. Use of early-TIPS for high-risk variceal bleeding. Results of a post-RCT surveillance study. *Journal of Hepatology* 2013;58(1):45-50.

3. Hernández-Gea V, Procopet B, Giraldez Á, et al; International Variceal Bleeding Observational Study Group and Baveno Cooperation. Preemptive-TIPS improves outcome in high-risk variceal bleeding: an observational study. *Hepatology* 2019;69(1):282-293.

 Consult Instructions
for Use
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* para obter a descrição completa de todas as advertências, precauções e contraindicações. [®] only

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE, *Together, improving life*, VIATORR e designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates, Inc.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. OUTUBRO 2021

Número do Registro na ANVISA: 80067930044

Nome comercial: GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion

W. L. Gore & Associates, Inc.

Flagstaff, AZ 86004

Asia Pacific +65 67332882 Europe 00800 6334 4673

United States 800 437 8181 928 779 2771 goremedical.com

