


Más información en AboutPFO.com

Hable con su médico y vea estos vídeos didácticos para obtener más información sobre el cierre del orificio en su corazón para ayudar a reducir el riesgo de otro ictus.



Obtenga información básica sobre el ictus criptógeno, los FOP y el tratamiento que puede reducir la probabilidad de que sufra otro ictus.



Vea la animación de cómo un coágulo de sangre puede pasar a través de un FOP y cómo esto puede causar un ictus.



Vea cómo se utiliza el ocluidor septal GORE® CARDIOFORM durante el procedimiento de cierre del FOP.



Vea la historia real de cómo Kathryn, que se sometió a un cierre de FOP, siguió adelante con su vida después de haber sufrido un ictus.

Es importante que hable con su médico sobre las ventajas y los riesgos potenciales del cierre del FOP.

Obtenga más información en [AboutPFO.com](https://www.aboutpfo.com) y pregunte a su médico si el cierre del FOP es adecuado para usted.

INDICACIONES DE USO EN EE. UU.: El ocluser septal GORE® CARDIOFORM es un dispositivo implantado permanentemente, indicado para el cierre percutáneo transcatéter de los siguientes defectos del tabique interauricular: comunicaciones interauriculares (CIA) tipo ostium secundum; foramen oval permeable (FOP) para reducir el riesgo de ictus isquémico recurrente en pacientes, sobre todo de entre 18 y 60 años de edad, que hayan tenido un ictus criptógeno debido a una posible embolia paradójica, según lo determinado por un neurólogo y un cardiólogo tras realizar una evaluación para excluir causas conocidas de ictus isquémico.

CONTRAINDICACIONES: El uso del ocluser septal GORE® CARDIOFORM está contraindicado en pacientes: que no puedan tomar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, como ácido acetilsalicílico, heparina o warfarina; con configuraciones anatómicas en las que el tamaño o la posición del ocluser septal GORE® CARDIOFORM interfiera con otras estructuras intracardiacas o intravasculares, como válvulas cardíacas o venas pulmonares; con endocarditis activa, u otras infecciones que produzcan bacteriemia, o pacientes que hayan presentado septicemia en el mes anterior a la implantación planificada, o con cualquier otra infección que no pueda tratarse con éxito antes de la colocación del dispositivo; con trombos intracardiacos. Para obtener una descripción completa de todas las advertencias, las precauciones y los acontecimientos adversos, consulte las *Instrucciones de uso* en goremedical.com. **Rx Only**

Esta información está pensada para propósitos formativos y de divulgación solamente. Los pacientes deberán consultar con sus médicos para obtener información sobre los riesgos asociados a los dispositivos y los procedimientos quirúrgicos mencionados en este documento. Todos los procedimientos quirúrgicos conllevan posibles riesgos para la salud. No todos los pacientes serán aptos para el tratamiento con estos dispositivos, y los resultados individuales pueden variar.

Siga siempre las instrucciones de su médico para el cuidado posoperatorio y la recuperación.

Precaución: La ley estadounidense restringe el uso de este dispositivo al indicado por prescripción facultativa (Rx).

Los productos mencionados pueden no estar disponibles en todos los mercados.

GORE, *Together, improving life*, CARDIOFORM y sus diseños son marcas comerciales de W. L. Gore & Associates.

©2019 W. L. Gore & Associates, Inc. OCTUBRE 2019

W. L. Gore & Associates, Inc.

Flagstaff, AZ 86004

T 800 437 8181 T 928 779 2771 goremedical.com

Together, improving life

